


2013-CÜ İL ÜÇÜN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN 2-Cİ QRANT MÜSABİQƏSİ (EIF/GAM-2013-2(8)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏ ÜZRƏ ELMİ NƏŞRLƏR VƏ ƏSAS ELMİ NƏTİCƏLƏR

- 1) Yenidoğulanlarda nekrotik enterokolitin inkişafına gətirib çıxaran daha əhəmiyyətli risk faktorları – fəsadlaşmış mamalıq-ginekoloji anamnez, hamiləliyin qeyri-qənaətbəxş gedişi (erkən toksikoz- $88\pm 3,2\%$, anemiya- $75\pm 4,3\%$, hestoz- $19\pm 3,9\%$, nefropatiya- $22,7\pm 6,3\%$, KRVI- $42\pm 4,2\%$), perinatal hipoksiya ($79,3\pm 4,5\%$), körpələrin süni qidalarla erkən qidalanması ($52\pm 5\%$) olmuşdur.
- 2) Nekrotik enterokolit olan yenidoğulanlarda 100% hallarda intoksikasiya, % hallarda gastrointestinal pozulmalar- $37\pm 4,9\%$ hallarda meteorizm, 100% hallarda ödlü qusma, nəcis ifrazının və konsistensiyasının dəyişməsi müşahidə olunmuşdur.
- 3) Nekrotik enterokolitin erkən diaqnostikasında iltihabönlü sitokinlərdən IL-6, TNF- α və C-reaktiv zülal daha informativ diaqnostik meyardır.
- 4) Nekrotik enterokolit olan yenidoğulanlarda hüceyrə və humoral immun göstəricilərində disbalans müşahidə olunmuşdur: İgA 2,3 dəfə, İgM 1,7 dəfə, İg G 2,4 dəfə, T və B-limfositlər müvafiq olaraq 1,3 və 1,7dəfə azalmışdır.
- 5) Nekrotik enterokolit olan yenidoğulanlarda kompleks müalicəyə probiotiklərin daxil edilməsi klinik, immunoloji və sitokin statusu göstəricilərinin yaxşılaşması ilə müşahidə olunmuşdur.

| No | Nəşr haqqında məlumat (Məqalələr) | Tam mətn |
|----|---|---|
| 1 | <p>Məqalənin adı: Yenidoğulanlarda nekrotik enterokolit zamanı probiotiklərin tətbiqi Müəlliflərin S.A.A: Nəsirova S., Rzayeva A. Nəşrin adı: Azərbaycan perinatologiya və pediatriya jurnalı, 2015, cild 1, № 3, s.21-28 E-link: - DOI: - İndeksənmə: - İF: -</p> |  |